



ASSOCIAZIONE ITALIANA ODONTOIATRI

Italian Dental Association

BOX 2

ESEMPIO FARMACI DA TENERE A PARTIRE DALLE CONDIZIONI PIÙ FREQUENTI IN STUDIO

Shock anafilattici, arresto cardiaco, ipotensione grave, asma grave - Adrenalina in fiale da 1 mg/ml

Shock anafilattici - Metilprednisolone sodio in polvere e solvente da 1000 mg/16ml

Attacco acuto asma moderato - Bentelan, Ventolin

Anafilassi con vasocostrizione - Etilerfrina in fiale da 10 mg/ml

Arresto cardiaco - Amiodarone, Lidocaina in fiale 2% da 10 ml,

Bradycardia, asistolie - Atropina solfato in fiale da 0,5 mg/ml,

Crisi angina – Diazepam in fiale 10 mg/2ml e gocce 5 mg/ml Isosorbidedinitrato cp sublinguali 5 mg

Emergenze ipertensive - Lasix, Adalat cp 10 mg

Analgesia in caso di sospetto infarto - Contramal

Crisi convulsive acute - Tavor

Emergenze da ipoglicemia - Glucosio

AIO
Associazione
Italiana
Odontoiatri

—
Via Valdieri, 32
10138 Torino

—
T +39 011 4343824
F +39 011 4301932

—
www.aio.it
segreteria@aio.it