




ASSOCIAZIONE ITALIANA ODONTOIATRI

Italian Dental Association



Schema di protocollo post- emergenza Covid-19

- Triage telefonico (all.1)
- Accoglienza-sala d'aspetto-dimissione
- Allestimento sala operativa
- Esecuzione della prestazione
- Riordino sala operativa

AIO
Associazione
Italiana
Odontoiatri

Via Valdieri, 32
10138 Torino

T +39 011 4343824
F +39 011 4301932

www.aio.it
segreteria@aio.it

Personale di segreteria

Attività

- Triage telefonico (All.1)
- Ripropone il triage al paziente e prova la febbre con termometro contactless
- Controlla e risolve eventuali problemi di affollamento



ASSOCIAZIONE ITALIANA ODONTOIATRI

Italian Dental Association

- Se il paziente o l'accompagnatore non ha la mascherina gli verrà consegnata dal personale dello studio
- Invita il paziente a disinfettare le mani con soluzione idroalcolica (All.6) e ad indossare dei guanti monouso
- Fa indossare calzari mono uso al paziente
- Se possibile mette giacca, cappotto, borse, ecc. del paziente in porta abiti in nylon
- Mantenere pulizia scrupolosa delle superfici (monitor, tastiera computer, penne, telefono, stampanti, ecc.).
- Almeno quotidianamente pulisce o fa pulire il pavimento con detergenti idonei
- Mantiene arieggiata la sala d'aspetto
- Da nuovo appuntamento e sbriga le pratiche amministrative

Accompagna il paziente aprendo la porta o se la apre il paziente disinfetta la maniglia

Protezioni

Il personale in segreteria deve indossare guanti e mascherina chirurgica che va cambiata almeno ogni ora se non contaminata da contatto con oggetti del paziente come bancomat, carte di credito, denaro, ecc.

Bibliografia

- Istituto Superiore di Sanità. Gruppo di lavoro ISS Prevenzione e controllo delle Infezioni. Indicazioni ad interim per un utilizzo razionale delle protezioni per infezione da SARS-COV- 2 nelle attività sanitarie e sociosanitarie (assistenza a soggetti affetti da covid-19) nell'attuale scenario emergenziale SARS-COV-2. Versione del 28 marzo 2020. Roma: Istituto Superiore di Sanità; 2020 (Rapporto ISS COVID-19, n.2/2020 Rev.)
- Ministero della Salute: Circolare 22 febbraio 2020, n. 5443 "COVID-2019. Nuove indicazioni e chiarimenti" .
- Ministero della Salute: Circolare 9 marzo 2020, n. 7922 "COVID-2019. Aggiornamento della definizione di caso"

AIO
Associazione
Italiana
Odontoiatri

Via Valdieri, 32
10138 Torino

T +39 011 4343824
F +39 011 4301932

www.aio.it
segreteria@aio.it



ASSOCIAZIONE ITALIANA ODONTOIATRI

Italian Dental Association

Allestimento sala operativa

Attività

- Tutte le superfici vanno deterse e disinfettate. (All.2)
- Fare in modo che sia più ordinata possibile, sulle superfici operative deve esserci solo materiale strettamente indispensabile alla terapia programmata.
- Dove è possibile ricoprire le superfici con pellicola di polietilene.
- Evitare di aprire i cassetti se non strettamente necessario.

Protezioni

- L'Aso utilizza mascherina chirurgica, schermi o occhiali protettivi e guanti in nitrile o in lattice
- L'ASO usa camice normale

AIO
Associazione
Italiana
Odontoiatri

Via Valdieri, 32
10138 Torino

T +39 011 4343824
F +39 011 4301932

www.aio.it
segreteria@aio.it



ASSOCIAZIONE ITALIANA ODONTOIATRI

Italian Dental Association

Pulizia dei pavimenti delle aree operative

Attività

- Nella zona operativa si consiglia la detersione e la disinfezione delle superfici, che potrebbero essersi contaminate con l'aerosol prodotto durante l'attività lavorativa, con disinfettante dedicato
- Questa attività va eseguita almeno una volta al giorno ma è consigliata dopo attività particolarmente contaminanti.

Protezioni

- L'Aso utilizza mascherina chirurgica, schermi o occhiali protettivi e guanti in gomma UNI-EN 374
- Camice normale

AIO
Associazione
Italiana
Odontoiatri

Via Valdieri, 32
10138 Torino

T +39 011 4343824
F +39 011 4301932

www.aio.it
segreteria@aio.it



ASSOCIAZIONE ITALIANA ODONTOIATRI

Italian Dental Association

Pulizia dei pavimenti delle reception

Attività

- Nella sala d'aspetto si consiglia la detersione dei pavimenti almeno una volta al giorno con i normali detersivi domestici
- Sedie e altre suppellettili vanno pulite e disinfettate almeno giornalmente
- Disinfettare le maniglie delle porte se toccate dal paziente

Protezioni

- L'Aso o il personale di segreteria utilizza mascherina chirurgica, schermi o occhiali protettivi e guanti in gomma UNI-EN 374
- Camice normale

AIO
Associazione
Italiana
Odontoiatri

Via Valdieri, 32
10138 Torino

T +39 011 4343824
F +39 011 4301932

www.aio.it
segreteria@aio.it



ASSOCIAZIONE ITALIANA ODONTOIATRI

Italian Dental Association

Esecuzione della prestazione

Attività

- Fare eseguire al paziente un gargarismo con soluzione disinfettante a base di iodopovidone all'1% o acqua ossigenata all'1%. Consigliata ripetizione gargarismo dopo 30 minuti.
- Limitare la prestazione alla terapia programmata.
- Limitare il più possibile la formazione di aerosol con uso di diga di gomma (se possibile) e doppia aspirazione chirurgica.
- Evitare nel possibile l'apertura dei cassettei.
- Evitare nel possibile la presenza di troppi operatori.
- Evitare nel possibile la presenza di accompagnatori in sala operativa

Protezioni

- DPI per le vie respiratorie: mascherina Ffp2/Ffp3 senza valvola
- DPI per occhi: maschere o schermi facciali che garantiscano la protezione degli occhi anche laterale
- Camice monouso, cuffia monouso, copri calzari monouso
- Guanti in lattice o nitrile

AIO
Associazione
Italiana
Odontoiatri

Via Valdieri, 32
10138 Torino

T +39 011 4343824
F +39 011 4301932

www.aio.it
segreteria@aio.it

Procedura All. 3 e 4



ASSOCIAZIONE ITALIANA ODONTOIATRI

Italian Dental Association

Riordino sala operativa

Attività

- Rimuovere le pellicole protettive.
- Eliminare tutte le pellicole e i dispositivi mono uso.
- Disinfettare tutte le superfici (riunito, servo mobili, seggiolini, radiografico, ecc.).
- Disinfettare l'aspirazione chirurgica.
- Arieggiare per almeno 15 minuti la sala operativa
- Portare strumentario utilizzato in sala di sterilizzazione per il ricondizionamento

Protezioni

- Se la stanza è stata arieggiata per almeno 15 minuti l'Aso utilizza mascherina chirurgica, schermi o occhiali protettivi e guanti in nitrile o lattice e camice normale
- Se la stanza non ha la possibilità di essere arieggiata subito l'Aso usa le stesse protezioni come durante la prestazione odontoiatrica

AIO
Associazione
Italiana
Odontoiatri

Via Valdieri, 32
10138 Torino

T +39 011 4343824
F +39 011 4301932

www.aio.it
segreteria@aio.it



ASSOCIAZIONE ITALIANA ODONTOIATRI

Italian Dental Association

Smaltimento rifiuti

Attività

Tutto il mono uso utilizzato va considerato potenzialmente infetto e riposto nell'apposito contenitore dei rifiuti speciali e andrà smaltito con ditta specializzata come da procedura consueta

Protezioni

- L' Aso deve seguire scrupolosamente le procedure di svestizione per evitare di contaminare se stessa e le superfici inanimate della stanza dove esegue l'operazione
- **Non servono protezioni ma attenzione**

Procedura all.4

AIO
Associazione
Italiana
Odontoiatri

Via Valdieri, 32
10138 Torino

T +39 011 4343824
F +39 011 4301932

www.aio.it
segreteria@aio.it



ASSOCIAZIONE ITALIANA ODONTOIATRI

Italian Dental Association

ALL. 1

Sintesi questionario informativo telefonico e all'ingresso per la prevenzione della trasmissione del coronavirus

1. Hai la febbre o hai avuto la febbre negli ultimi 14 giorni? SI () NO ()
2. Presenta i sintomi di una infezione respiratoria acuta. (Febbre, tosse, mal di gola, dispnea, disgeusia, ecc.)
SI () NO ()
3. Hai avuto insorgenza recente di problemi respiratori, come tosse o difficoltà respiratoria negli ultimi 14 giorni
SI () NO ()
4. Sei entrato in contatto con un paziente con infezione confermata SARS-CoV-2 negli ultimi 14 giorni?

SI () NO ()
5. Vi sono almeno due persone con esperienza documentata di febbre o problemi respiratori negli ultimi 14 giorni in stretto contatto con voi?

SI () NO ()
6. Hai partecipato di recente a riunioni, incontri o hai avuto stretti contatti con molte persone che non conosci bene?

SI () NO ()

AIO
Associazione
Italiana
Odontoiatri

Via Valdieri, 32
10138 Torino

T +39 011 4343824
F +39 011 4301932

www.aio.it
segreteria@aio.it



ASSOCIAZIONE ITALIANA ODONTOIATRI

Italian Dental Association

Definizioni:

Definizione di caso

Caso sospetto

- Una persona con insorgenza improvvisa di almeno uno dei seguenti sintomi: febbre, tosse, dispnea e senza un'altra eziologia che spieghi pienamente la presentazione del quadro clinico;
- Storia di viaggi o residenza in un Paese/area in cui è segnalata trasmissione locale (facendo riferimento ai rapporti quotidiani dell'OMS e ai bollettini della situazione epidemiologica italiana) durante i 14 giorni precedenti l'insorgenza dei sintomi;
- Una persona con uno dei precedenti sintomi che è stata a stretto contatto con un caso probabile o confermato di COVID-19 nei 14 giorni precedenti l'insorgenza dei sintomi;
- Una persona con infezione respiratoria acuta grave (febbre e almeno un segno/sintomo di malattia respiratoria, per esempio tosse, difficoltà respiratoria)

La definizione di caso è molto stringente e deve rispettare i criteri stabiliti dal Ministero della Salute. Di fronte a un sospetto di infezione da SARS-CoV-2 l'esame dirimente è la Real Time PCR. A oggi non ci sono terapie dirette contro il nuovo coronavirus né vaccini, quindi il trattamento è solo sintomatico e di supporto.

Definizione di contatto stretto

La definizione di contatto stretto recepita dal Ministero della Salute è la seguente:

- operatore sanitario o altra persona impiegata nell'assistenza di un caso sospetto o confermato di COVID-19, o personale di laboratorio addetto al trattamento di campioni di SARS-CoV-2;
- essere stato a stretto contatto (faccia a faccia) o nello stesso ambiente chiuso con un caso sospetto o confermato di COVID-19; o vivere nella stessa casa di un caso sospetto o confermato di COVID-19;
- avere viaggiato insieme a un paziente con SARS-CoV-2 in qualsiasi mezzo di trasporto;

AIO
Associazione
Italiana
Odontoiatri

Via Valdieri, 32
10138 Torino

T +39 011 4343824
F +39 011 4301932

www.aio.it
segreteria@aio.it



ASSOCIAZIONE ITALIANA ODONTOIATRI

Italian Dental Association

Caso probabile

- Un caso sospetto il cui risultato del test per SARS-CoV-2 è dubbio utilizzando protocolli specifici di Real Time PCR per SARS-CoV-2 presso i Laboratori di Riferimento Regionali individuati o è positivo utilizzando un test pan-coronavirus;

Caso confermato

- Un caso con una conferma di laboratorio per infezione da SARS-CoV-2 effettuata presso il Laboratorio di Riferimento Nazionale dell'Istituto Superiore di Sanità (ISS) o da Laboratori Regionali di Riferimento, indipendentemente dai segni e dai sintomi clinici.

Paziente che dopo essere stato sintomatico può essere considerato guarito da COVID-19

- Si definisce clinicamente guarito un paziente che, dopo aver presentato manifestazioni cliniche (febbre, rinite, tosse, mal di gola, eventualmente dispnea e, nei casi più gravi, polmonite con insufficienza respiratoria) associate all'infezione documentata da SARS-CoV-2, diventa asintomatico per risoluzione della sintomatologia clinica presentata. Il soggetto clinicamente guarito può risultare ancora positivo al test per la ricerca di SARS-CoV-2. Il paziente guarito è colui il quale risolve i sintomi dell'infezione da COVID-19 e che risulta negativo in due test consecutivi, effettuati a distanza di 24 ore uno dall'altro, per la ricerca di SARS-CoV-2. Pur non esistendo chiare evidenze a supporto, si ritiene opportuno suggerire di risottoporre al test il paziente risultato positivo, una volta avvenuta la risoluzione dei sintomi clinici e, in caso di persistenza della sintomatologia, non prima di 7 giorni dal riscontro della prima positività.

La classificazione del paziente si effettua attraverso il Triage.

AIO
Associazione
Italiana
Odontoiatri

Via Valdieri, 32
10138 Torino

T +39 011 4343824
F +39 011 4301932

www.aio.it
segreteria@aio.it



ASSOCIAZIONE ITALIANA ODONTOIATRI

Italian Dental Association

ALL. 2

Indicazioni per l'uso dei disinfettanti

Utilizzare disinfettanti efficaci anche contro il coronavirus secondo indicazioni del produttore (ad esempio a base di alcool o cloro)

Non vanno utilizzati quando l'obiettivo da raggiungere è la sterilizzazione;

Le superfici da disinfettare, se sporche, vanno accuratamente pulite e asciugate, prima di essere disinfettate;

Dopo la disinfezione non risciacquare le superfici trattate per consentire al prodotto di svolgere un'azione residua;

Rispettare le modalità d'uso riportate dal produttore;

Per travasare i prodotti utilizzare solo recipienti perfettamente puliti e asciutti contrassegnati all'esterno con etichette (diluizione e scadenza);

I flaconi vanno conservati lontano da fonti di luce e calore e vanno chiusi subito dopo l'uso;

I disinfettanti efficaci contro Covid-19 sono: ipoclorito di sodio 0,1/0,5%, acqua ossigenata 0,5% per 1 minuto, etanolo 62-71% per 1 minuto (Kampf G et al., 2020 e Ministero della Salute febbraio 2020)

AIO
Associazione
Italiana
Odontoiatri


Via Valdieri, 32
10138 Torino

T +39 011 4343824
F +39 011 4301932

www.aio.it
segreteria@aio.it

ALL.3**Procedura vestizione**

1. lavare le mani con disinfettante idroalcolico per almeno 20 secondi
2. mettere il primo paio di guanti
3. indossare il camice monouso
4. indossare i copri calzari se lo riteniamo necessario in base alla terapia applicata
5. indossare la cuffia per la protezione del capo
6. indossare la mascherina FFP2/FFP3
7. indossare le protezioni per gli occhi
8. inserire un secondo paio di guanti che vanno a coprire il polsino del camice monouso





AIO
Associazione
Italiana
Odontoiatri

Via Valdieri, 32
10138 Torino

T +39 011 4343824
F +39 011 4301932

www.aio.it
segreteria@aio.it



ALL. 4

Procedura svestizione

- 1) Togliere il camice monouso
- 2) Togliere il secondo paio di guanti
- 3) Lavare il primo paio di guanti con soluzione idroalcolica per almeno 20 secondi
- 4) Togliere le protezioni oculari afferrandole dalla parte posteriore che è meno contaminata avendo l'accortezza di non sfilare il copricapo
- 5) Togliere la mascherina
- 6) Togliere il copricapo prendendolo nel centro e sfilandolo verso l'alto
- 7) Togliere i calzari se li abbiamo utilizzati
- 8) Togliere il primo paio di guanti
- 9) Lavare le mani con soluzione idroalcolica per almeno 20 secondi

n.b. a mano a mano che vengono tolti i dispositivi monouso vanno gettati nel contenitore dei rifiuti speciali

AIO
Associazione
Italiana
Odontoiatri

Via Valdieri, 32
10138 Torino

T +39 011 4343824
F +39 011 4301932

www.aio.it
segreteria@aio.it





Lavare i guanti con soluzione idroalcolica



Togliere le protezioni oculari



Togliere la mascherina



Togliere la copertura per capo



Togliere il primo paio di guanti



Mettere tutto il monouso nel contenitore dei rifiuti speciali



Lavare le mani con soluzione idroalcolica

All. 5

Lavaggio sociale delle mani

- 1) Bagnare ed insaponare le mani con sapone liquido
- 2) Strofinare accuratamente facendo particolare attenzione agli spazi ungueali e interdigitali per 15-30 secondi
- 3) Risciacquare abbondantemente per 30 secondi
- 4) Asciugare bene con salviette mono uso



AIO
Associazione
Italiana
Odontoiatri

Via Valdieri, 32
10138 Torino

T +39 011 4343824
F +39 011 4301932

www.aio.it
segreteria@aio.it

n.b. va sempre fatto ad inizio e fine turno lavorativo, prima e dopo l'uso dei servizi igienici, prima e dopo l'uso dei guanti E SEMPRE VANNO TOLTI ANELLI, OROLOGIO E BRACCIALI

All. 6

Disinfezione mani


- 1) Applicare uniformemente 5 ml di soluzione antisettica detergente
- 2) Frizionare accuratamente unghie, dita, palmi e dorsi delle mani, polsi e parte degli avambracci per circa 15/20 secondi
- 3) Attendere che il detergente a base alcolica evapori completamente.




Come frizionare le mani con la soluzione alcolica?

**USA LA SOLUZIONE ALCOLICA PER L'IGIENE DELLE MANI!
LAVALE CON ACQUA E SAPONE SOLTANTO SE VISIBILMENTE SPORCHE!**


 Durata dell'intera procedura: **20-30 secondi**



Versare nel palmo della mano una quantità di soluzione sufficiente per coprire tutta la superficie delle mani.




frizionare le mani palmo contro palmo



il palmo destro sopra il dorso sinistro intrecciando le dita tra loro e viceversa



palmo contro palmo intrecciando le dita tra loro




dorso delle dita contro il palmo opposto tenendo le dita strette tra loro



frizione rotazionale del pollice sinistro stretto nel palmo destro e viceversa



frizione rotazionale, in avanti ed indietro con le dita della mano destra strette tra loro nel palmo sinistro e viceversa



...una volta asciutte, le tue mani sono sicure.

AIO
Associazione
Italiana
Odontoiatri

Via Valdieri, 32
10138 Torino

T +39 011 4343824
F +39 011 4301932

www.aio.it
segreteria@aio.it



ASSOCIAZIONE ITALIANA ODONTOIATRI

Italian Dental Association

Trattamento minimo dell'acqua in uscita dal riunito

- Evitare il ristagno dell'acqua all'interno del riunito scaricando completamente l'acqua a fine giornata lavorativa
- Flussare l'acqua dalla siringa aria-acqua e dai cordoni dei manipoli almeno 2 minuti all'inizio della attività lavorativa
- Flussare l'acqua per almeno 20/30 secondi tra un paziente e l'altro

Trattamento dei condizionatori e dei sistemi di ricambio dell'aria centralizzato

- Una volta all'anno fare disinfezione e controllo del liquido refrigerante con ditta specializzata
- Filtro e griglie andrebbero pulite almeno una volta al mese con sapone neutro e acqua tiepida
- Igienizzare e disinfettare il condizionatore almeno una volta alla settimana in zona operativa
- Usare sempre guanti in gomma e protezioni oculari
- Nel caso ci fosse presente un sistema di ricambio centralizzato dell'aria si deve escludere il sistema di ricircolo dell'aria e fa fatta accurata pulizia e igienizzazione dei filtri e fare pulizia almeno settimanale delle bocchette di ingresso dell'aria.

AIO
Associazione
Italiana
Odontoiatri

Via Valdieri, 32
10138 Torino

T +39 011 4343824
F +39 011 4301932

www.aio.it
segreteria@aio.it